


Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья



Проводится:

- в возрасте 18 - 49 лет;
- в два этапа.

*В текущем году Вы можете пройти и диспансеризацию (профилактический медицинский осмотр) и диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья.



МУЖЧИНЫ

1 этап:

1. Анкетирование


2. Прием врачом-урологом:

- сбор жалоб и анамнеза;
- физикальное обследование (оценка вторичных половых признаков, особенностей телосложения, состояния грудных желез, распределения волосяного покрова, измерение окружности талии);
- осмотр наружных половых органов.

2 этап:

(при выявлении патологии на 1 этапе)

- спермограмма;
- лабораторные исследования в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза;
- УЗИ предстательной железы и органов мошонки;
- повторный прием (осмотр) врача-уролога: индивидуальное консультирование, установка диагноза, определение группы репродуктивного здоровья, группы диспансерного наблюдения, направление на дополнительные обследования при наличии показаний.



ЖЕНЩИНЫ

1 этап:

1. Анкетирование

2. Прием (осмотр) врачом акушером-гинекологом:

- сбор жалоб и анамнеза;
- гинекологический осмотр;
- осмотр и пальпация молочных желез;
- краткое индивидуальное консультирование;
- забор влагалищного отделяемого для проведения микроскопии мазка;
- мазок на онкоцитологию, определение pH слизистой оболочки влагалища;
- мазок на выявление возбудителей инфекционных заболеваний (18-29 лет).

2 этап:

(при выявлении патологии на 1 этапе)

- лабораторные исследования мазков в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза (30-49 лет);
- УЗИ органов малого таза;
- УЗИ молочных желез;
- повторный прием врача акушера-гинеколога: индивидуальное консультирование, гинекологический осмотр, установление диагноза, группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, направление на дополнительные обследования при наличии показаний.



Скрининг репродуктивного здоровья проводится в целях выявления признаков заболеваний или состояний, которые могут послужить причинами бесплодия у мужчин и женщин.

