

Подготовка к проведению МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства:

В течении 1-2 дней прием препарата «Эспумизан» - для устранения повышенного газообразования. (по 2 кап.3 раза в сутки , можно с небольшим количеством жидкости, после каждого приема пищи и при необходимости перед сном. В течении 1-2 дней.)

В день проведения обследования должен быть стул.

Клизмы и слабительные запрещены. Допустим «Микролакс» утром в день процедуры.

Диета за 1-2 дня. Исключить из своего рациона следующие продукты:

- - ржаной хлеб
- - молоко
- - газированные напитки
- - сырые овощи
- - фрукты
- - соки
- - кондитерские изделия
- - жаренные, жирные, острые продукты
- - мясо
- - алкоголь

Не курить за 3 часа до процедуры.

Перед исследованием 4 часа голода. В течении дня голодать нельзя !

Подготовка к проведению МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства:

В течении 1-2 дней прием препарата «Эспумизан» - для устранения повышенного газообразования. (по 2 кап.3 раза в сутки , можно с небольшим количеством жидкости, после каждого приема пищи и при необходимости перед сном. В течении 1-2 дней.)

В день проведения обследования должен быть стул.

Клизмы и слабительные запрещены. Допустим «Микролакс» утром в день процедуры.

Диета за 1-2 дня. Исключить из своего рациона следующие продукты:

- - ржаной хлеб
- - молоко
- - газированные напитки
- - сырые овощи
- - фрукты
- - соки
- - кондитерские изделия
- - жаренные, жирные, острые продукты
- - мясо
- - алкоголь

Не курить за 3 часа до процедуры.

Перед исследованием 4 часа голода. В течении дня голодать нельзя !

Подготовка к проведению МРТ органов малого таза (предстательной железы у мужчин) :

Для максимально качественного и полного описания полученных результатов врачом необходимо иметь с собой всю имеющуюся мед.документацию: послеоперационные выписки, данные (снимки и заключения) предыдущих исследований МРТ, УЗИ, СКТ, а так же желательно направление лечащего врача.

Диета за 1-2 дня. Исключить из своего рациона следующие продукты:

- - ржаной хлеб
- - молоко
- - газированные напитки
- - сырые овощи
- - фрукты
- - соки
- - кондитерские изделия
- - жаренные, жирные, острые продукты
- - мясо
- - алкоголь

В течении 1-2 дней прием препарата «Эспумизан» - для устранения повышенного газообразования. (по 2 кап.3 раза в сутки , можно с небольшим количеством жидкости, после каждого приема пищи и при необходимости перед сном. В течении 1-2 дней.)

Подготовка кишечника: при нормальном пищеварении – естественное опорожнение кишечника в день исследования , при запорах – использование щадящих микроклизм «Микролакс».

За 30-40 минут до начала исследования принять 2 таблетки «Но-шпа».

Мочевой пузырь должен быть умеренно наполнен, так что бы хотелось в туалет,но при этом можно было терпеть (обследование по времени 40 мин)

У ЖЕНЩИН: рекомендуется проведение обследования на 7-12 день менструального цикла, так же возможно проведение обследования во вторую фазу цикла.

В день проведения обследования должен быть стул.

Клизмы и слабительные запрещены. Допустим «Микролакс» утром в день процедуры.

Не курить за 3 часа до процедуры.

Перед исследованием 4 часа голода. В течении дня голодать нельзя !